



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **KOKAL CALCIO**

Fertilizante folia enriquecido con Calcio, Boro, Zinc, aditivado con extractos de Algas Marinas y Aminoácidos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Complejos de Bio nutrientes CALCIO, BORO y ZINC quelatados por ácidos amino carboxílicos, contiene extracto de algas marinas y aminoácidos específicos.

Su composición protohormonal promueve el buen desarrollo, cuajado del fruto y la durabilidad de los frutos post-cosecha. La acción bioestimulante Ca-B-Zn corrige las deficiencias nutricionales de estos elementos, facilita la síntesis de diversos constituyentes celulares, mejora los procesos fisiológicos de la planta, logrando mayor producción y excelente calidad de los frutos.

PRINCIPALES BENEFICIOS OFRECIDOS AL CULTIVO:

Previene abortos florales y asegurar la buena formación y cuajado de los frutos.

Fortalece la estructura de la pared celular (firmeza).

Interviene en la maduración de los frutos.

Favorece los procesos enzimáticos y hormonales.

Controla el movimiento de azúcares, almidones y aminoácidos.

Influye en el alargamiento y división celular; mejora y uniformiza el llenado de los granos, semillas y frutos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA GARANTIZADA

Complejo de Calcio (Ca)	10.00%
Complejo de Boro (B)	2.00%
Complejo de Zinc (Zn)	5.00%
Algas Marinas	10.00%
Aminoácidos libres	4.00%
Ácidos Húmicos y Fúlvicos	10%
Lignosulfonato	5.00%

Elementos adicionales:

Vitaminas: Vitamina E, Ácido fólico, Biotina, Riboflavina, Tiamina, Betaínas, Caroteno.

Carbohidratos: Manitol, Ácido algínico, Laminarano.



DOSIS:

La dosis general es de 400ml por cilindro de 200 litros.

* La dosis incrementará en función a la deficiencia observada en el cultivo.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Generalmente en las etapas de prefloración, floración y llenado de frutos o granos, caída de pétalos, engrosamiento de bulbo y/o de acuerdo al cuadro siguiente:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa, Camote	1º Al inicio de la tuberización, posteriormente cada 15 - 20 días.
Cítricos, Paltos	1º A la primera floración, 2º Caída de pétalos, 3º Inicio del cuajado, 4º A los 10 días.
Manzanos, Perales, Melocotón	1º Caída de pétalos, 2º Cuajado de frutos, 3º 30 días de la última aplicación.
Cucurbitáceas	1ª Floración, 2º Inicio del cuajado, 3º A los 15-20 días.
Leguminosas	1º Prefloración, 2º Inicio de cuajado de vainas, 3º A los 15-20 días.
Algodón	1º Prefloración, 2º Inicio de llenado de bellotas y 3º A los 15 - 20 días.
Vid	1º Inicio de la floración, 2º A la inflorescencia y 3º Formación de granos.
Tomate, Pimiento, Páprika	1º Prefloración, 2º Caída de flores, 3º A los 15 días del inicio de cuajado, 4º A los 30 días del inicio de cuajado.

Formulación: Líquido soluble en agua.

Aspecto: Líquido de color marrón oscuro a negro.
* El producto podría presentar ligera sedimentación sin que ésta afecte su eficacia.

Compatibilidad: Para mezclas de varios productos se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad.

Presentaciones: 500 ml, 1 L, 4L, 20 L, 200 L.

Detalles del envase:

- Sello interno – lana.
- Tapa externa – tapa roscada.
- Impresiones en envase – Número de lote, fecha de producción, fecha de vencimiento.



- Sello externo de garantía – Termo sellado

MODO DE APLICACIÓN:

- **Pulverización foliar.** Mezclar en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje, usualmente 400 ml del producto para 200-100 l/ha.
- **Agua de riego.** Mezclar 500 ml del producto en 60-100 litros de agua.
* Agitar el envase fuertemente antes de su utilización.

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación del producto: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento

ADVERTENCIAS:

- No transportar junto con alimentos.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- No fumar, comer, ni beber durante la manipulación del producto.
- Lavarse con agua y jabón después de usar.
- Almacenar entre 5 y 30°C.

RESPALDADO POR NATURAL AGRO CORP S.A.C.